

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.**

Αντενδείξεις:

- Υπερευαισθησία στην παρακεταμόλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.
- Βαριά ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.
- Σε νεφρικές λιθιάσεις (μόνον τα αναβράζοντα δισκία).

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Η παρακεταμόλη πρέπει να χορηγείται με προσοχή:

- σε άτομα με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία,
- σε αλκοολικούς,
- σε γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη και την περίοδο της γαλουχίας.
- σε χρόνια λήψη ή σε μεγάλες δόσεις

Τα αναβράζοντα δισκία δεν συνιστώνται σε ασθενείς που ακολουθούν άναλο δίαιτα (νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς).

Τα προϊόντα APOTEL με περιεκτικότητα 1000 mg δεν πρέπει να χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

- Δερματικό εξάνθημα ή ερύθημα.
- Κατά τη χρόνια λήψη ή τη λήψη μεγάλων δόσεων αναφέρονται ελαφρά γαστρικά ενοχλήματα, αιμολυτική αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία, μεθαιμοσφαιριναιμία, δερματικά εξανθήματα, κνίδωση, πυρετός, υπογλυκαιμία, διέγερση του ΚΝΣ ή υπνηλία, θρομβοκυττοπενική πορφύρα.
- Παρατεταμένη λήψη υψηλών δόσεων μπορεί να προκαλέσει νεφροπάθεια και σπανίως παγκρεατίτιδα.

Αριθμοί Αδειών Κυκλοφορίας: APOTEL δισκίο 500mg/tab: 41559/07/22.05.2008, APOTEL αναβράζοντα δισκία (500)mg/tab: 41544/07/22.05.2008, APOTEL υπόθετα 125, 250 & 500mg/sup.: -125mg: 41562/07/22.05.2008, -250mg: 41564/07/22.05.2008. -500mg: 41566/07/22.05.2008, APOTEL πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 100mg/ml: 41556/07/22.05.2008, APOTEL σιρόπι 120mg/5ml: 41541/07/22.05.2008, APOTEL C-500 δισκία αναβράζοντα (500+300)mg/tab: 8570/06.02.2007, APOTEL EXTRA αναβράζοντα δισκία (500+65)mg/tab: 44048/29.09.2008. APOTEL EXTRA δισκία (500+65)mg/tab: 44050/29.09.2008, APOTEL αναβράζοντα δισκία (1000) mg/tab: 41546/07/22.05.2008, APOTEL δισκίο 1000 mg/tab: 34752/14/15.01.2019, APOTEL HOT LEMON HONEY αναβράζοντα κοκκία: 323452/18/19.07.2019.